



Флора Северной Осетии является очень богатой, в ней присутствует огромное разнообразие видов различных растений, среди которых также встречаются и реликтовые, которые относятся еще ко временам до наступления ледникового периода. Кроме того, растительный мир Северной Осетии также включает в себя те растения, которые встречаются очень редко и, разумеется, нельзя не упомянуть о том, что среди представителей флоры данной республики имеются несколько видов эндемиков, причем, по сведениям ботаников, они составляют примерно двадцать пять процентов всей растительности. Как известно, территория Северной Осетии включает в себя несколько природных зон, поэтому, как и в случае с животным миром, для каждой из этих зон характерна своя особенная флора.

Разумеется, на территории республики имеется довольно много лесов, в которых растут сосны, березы и буки. Необходимо заметить, что доля горных лесов в значительной мере превышает долю лесов равнинных, поскольку лесозаготовки проводились в тех районах, которые более доступны для этого. Интересным фактом является то, что наибольшее количество реликтовых деревьев можно встретить именно в буковых лесах республики, которые, к слову сказать, являются самыми распространенными. Кроме того, в буковых лесах можно встретить также реликтовые кустарники, которые произрастают в основном в подлеске. Кроме того, имеются на территории республики и небольшие дубовые леса, которые располагаются в основном на горных склонах, но они являются немногочисленными. В лесах, которые пролегают вдоль рек и в низинах, чаще всего встречаются различные виды кустарников, а также ольхи.

На равнинах республики растут преимущественно различные травы, которые, в целом, характерны для степей, однако на данной территории некоторые из растений являются реликтовыми. Очень красивы и горные луга Северной Осетии, на которых также произрастает множество трав, причем нередко очень высоких, а в теплое время года эти луга покрываются удивительными цветами, являя собой причудливый ковер. Высоко в горах растительность значительно беднее, и представляет собой в основном виды, которые распространены в предтундровой зоне.